

Edad: 2 meses

ALIMENTACIÓN

En esta edad su niño todavía necesita fórmula solamente de la leche materna o del niño con hierro. Nunca utilice la fórmula con punto bajo o ningún hierro. Las botellas suplementales de agua no son necesarias. Los niños están en un horario más fiable para entonces, alimentando 5-6 veces diariamente. No es hora de comenzar el cereal o los alimentos para niños todavía. Los estudios han demostrado que eso comenzar los alimentos sólidos puede llevar demasiado temprano a las alergias alimentarias, a la diabetes juvenil, a la enfermedad celiaca y a la obesidad. No apoye por favor la botella ni ponga su plano del bebé mientras que alimenta puesto que estas acciones pueden llevar a la obstrucción y a infecciones crecientes del oído. La mayoría de los niños comerán entre 28 a 32 onzas cada día. La expectoración es mismo campo común, asociado especialmente a burping. No es un problema mientras el niño esté ganando el peso. Escupir generalmente resoluciones entre 6 y 9 meses de la edad.

HÁBITOS DEL INTESTINO

La mayoría de los bebés filtrarán para pasar un movimiento de intestino; las muestras incluyen gruñir y el torneado rojo en la cara. Esto es normal y no es una muestra del estreñimiento (pequeño difícilmente pelotilla-como taburetes). Los taburetes normales deben ser suaves en consistencia. La frecuencia de taburetes es extremadamente variable con cada niño.

DESARROLLO

Los niños gozan de caras sonrientes y sonríen a veces a cambio. Alcanzan para las cosas con sus manos. Pueden levantar y dar vuelta a la cabeza de lado a lado. Aunque los bebés no deban dormir en sus panzas, deben jugar en su panza para animar control de la cabeza y del cuello. Muchos niños hacen sonidos cooing en respuesta a palabras apacibles, calmantes.

BAÑO

Los bebés gozan el ser bañado. Utilice una despedregadora apacible tal como jabón del cetaphil o de la paloma. Preste la especial atención al área del pañal. Las muchachas deben ser frente limpiado a mover hacia atrás. En muchachos uncircumcised tire suavemente del foreskin de nuevo a limpio la uretra. Nunca fuerce la parte posterior del foreskin hasta el final. Volverá gradualmente como las edades del bebé. Para evitar escaldar siempre el cheque la temperatura del agua del baño.

SUEÑO

Cada bebé es diferente en vista de sus patrones durmientes. Algunos despiertan cada 3-4 horas y otros duermen con la noche. Si se requiere una alimentación de la noche, desaliente la alegría y hablar durante la alimentación y ponga al niño de nuevo a sueño cuanto antes. Los niños deben dormir en su parte posterior o lado a ayudar a prevenir SIDS. Intente estimular a su bebé durante horas diurnas hablando, cantando, leyendo, y jugando música.

SEGURIDAD

Los accidentes son la causa del número uno de la muerte en el primer año de vida. Para promover la seguridad para su bebé:

1. Utilice siempre un asiento de coche posterior aprobado del revestimiento no importa cómo es corto de un viaje.
2. Nunca saque a su bebé del asiento de coche mientras que el coche está en el movimiento.
3. El asiento de coche infantil se debe poner en el asiento trasero solamente.
4. Tenga cuidado de intenciones bienintencionadas de más viejos hermanos "de alimentar al bebé" o "detenga al bebé".
5. Nunca deje su bebé desatendido en la bañera o alrededor del agua derecha de la clase.
6. Nunca ate un pacificador en una secuencia alrededor del cuello de su bebé. En lugar fijelo a la camisa.
7. Los niños están aprendiendo rodar en esta edad así pues, nunca dejan su bebé solo en una tabla, una cama o un sofá cambiante.
8. Guarde las bolsas de plástico, los pernos y los botones de seguridad hacia fuera al pesebre y fuera del alcance del bebé.
9. Cerciórese de siempre que los lados del pesebre estén para arriba totalmente, y los listones del pesebre no es no más de 2 y 3/8 avanza a poquitos aparte. Si una poder de coque cabe entre los listones, el pesebre no es seguro para su bebé.
10. Fije su temperatura del calentador de agua a 120 grados de F.

INMUNIZACIONES

Su bebé recibirá su primer redondo de inmunizaciones hoy. Incluyen: DTaP (difteria, tétanos, y tosferina), Hib (gripe de Haemophilus, tipo B), hepatitis B, poliomielitis, PCV7 (vacuna neumocócica) y Rotateq (vacuna del rotavirus). Algunas de estas inmunizaciones se mezclan juntas en el mismo tiro de modo que su bebé no requiera 5 inyecciones separadas. Rotateq es una vacuna tomada por vía oral.

DOSIFICACIÓN de TYLENOL (acetaminophen)

Si su niño parece estar en dolor o tiene una fiebre, usted puede dar Tylenol. La dosificación es como sigue:

<i>Peso</i>	<i>Tipo</i>	<i>Dosis</i>	<i>Intervalo</i>
10-11 libras	gotas infantiles	cuentagotas del ½ (0.4ml)	4-6 horas
12-17 libras	gotas infantiles	1 cuentagotas (0.8ml)	4-6 horas
	niños líquidos	tsp del ½. (2.5ml)	4-6 horas
18-23 libras	gotas infantiles	1 cuentagotas del ½ (1.2ml)	4-6 horas
	niños líquidos	tsp del ¾.	4-6 horas

No dé Motrin o Advil (ibuprofen) a su bebé antes de 6 meses de la edad.

CUÁNDO LLAMAR

Usted debe llamar al doctor si su bebé desarrolla el > duradero de la irritabilidad o de la fiebre; 48 horas, diarrea, el vomitar, o cualquier otro síntoma usted se refiere alrededor.

VISITA SIGUIENTE

La cita siguiente de su niño debe ser en 4 meses de la edad. Por favor traiga a su expediente del tiro con usted a cada uno la visita del niño del pozo.

Premier Pediatrics • 1002 de 705 E. Marshall • Longview, Texas 75601
(903) 247-7700 • Fax: (903) 238-9185